



Association d'Aide aux Personnes Epileptiques asbl

Tél./Fax : 52 52 91 GSM : 621 357 090
B.P. 45 L – 3401 Dudelange
E-mail : aape @pt.lu
CCPL :IBAN LU11 1111 1366 5680 0000

Zuerst möchten wir uns bei einem unserer Mitglieder bedanken, welches uns auf diesen Zusammenhang hingewiesen hat und uns Informationen zugeschickt hat. Ein Neurologe der sich auch auf diesem Gebiet auskennt hat dies dann bestätigt.

Epilepsie und ADHS

ADHS ist die Abkürzung für eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Es gibt die hyperaktive Form über die oft mehr in den Medien berichtet wird und die weniger erforschte **unaufmerksame Form** der ADHS.

Gerade jetzt zu Schulbeginn ist es wichtig für Eltern die ein Kind haben, das an Epilepsie erkrankt ist, zu erfahren, dass möglicherweise nicht alle Schulschwierigkeiten ihres Kindes auf die Epilepsie oder die deswegen eingenommen Medikamente zurück zu führen sind. Eine Reihe von Kindern leidet neben der Epilepsie auch noch an der unaufmerksame Form der ADHS oder zeigt Symptome von Hyperaktivität und/oder Impulsivität. Dies kann sich dann allgemein in schlechteren Schulresultaten aber auch in körperlichen Symptomen der Überforderung wie Kopf- und Bauchschmerzen äußern.

Wir können Eltern, die jetzt eventuell eine solche weitere Erkrankung ihres Kindes vermuten nur anraten einen Neurologen zu konsultieren, welcher sich neben seinen Kenntnissen in Epilepsie auch mit ADHS auskennt. Dieser kann dann eine Diagnose vornehmen und durch Medikamente auch diese Erkrankung behandeln. Vielen Kindern (und ihren Eltern) konnte schon so geholfen werden.

Eltern oder Fachpersonal, welche sich weiter informieren möchten, können wir **Kopien von Fachartikeln auf Anfrage in Deutsch oder Französisch zu senden** mit der Post oder auf elektronischem Weg.

1. Epilepsie und ADHS – eine seltene Kombination ? STOLLHOFF Kirsten in Pädiatrie hautnah
2. Les problèmes d'attention et le TDA/H dans l'épilepsie. Mémoire de LAGADEC Cécile
3. L'épilepsie et le THADA. Dr AKDAG Sare pour BC Epilepsy Society Canada

Epilepsie et trouble du déficit de l'attention TDA/H

D'abord nous aimerais remercier une de nos membres qui nous a informés sur ce sujet en nous envoyant un document en allemand. Un neurologue expert en la matière a confirmé ces informations.

Le trouble du déficit de l'attention caractérisé par des problèmes de concentration et d'attention plus ou moins hyperactif. La forme de la maladie avec hyperactivité est la plus connue.

Pour la rentrée scolaire il est important que les parents, qui ont un enfant épileptique, sachent que les problèmes comportementaux ou d'inattention à l'école ou même d'échec scolaire ne sont pas forcément liés à l'épilepsie ou aux médicaments que l'enfant doit prendre pour traiter son épilepsie mais que l'enfant peut montrer en supplément un TDA/H. De plus, des preuves suggèrent que le TDA/H peut parfois être antérieur au début de l'épilepsie. Les symptômes peuvent se manifester par des difficultés d'apprentissage mais également par des symptômes de peur et de surmenage tels des maux de tête ou de ventre.

Nous recommandons vivement aux parents, qui maintenant croient que leur enfant pourrait présenter les deux maladies, de consulter un neurologue qui n'est pas seulement expert en traitement de l'épilepsie mais qui s'y connaît également dans le diagnostic du TDA/H. Celui-là peut poser le diagnostic et prescrire des médicaments pour traiter les deux maladies. Ceci a amélioré les conditions de vie de beaucoup d'enfants (et de leurs parents)

Pour les parents ou les professionnels qui aiment s'informer d'avantage nous pouvons **à leur demande leur envoyer des copies d'articles en français ou en allemand** par la poste ou par courriel.

1. Epilepsie und ADHS – eine seltene Kombination ? STOLLHOFF Kirsten in Pädiatrie hautnah
2. Les problèmes d'attention et le TDA/H dans l'épilepsie. Mémoire de LAGADEC Cécile
3. L'épilepsie et le THADA. Dr AKDAG Sare pour BC Epilepsy Society Canada